

Etiketuitbreiding EXIREL

Onlangs heeft het insectenbestrijdingsmiddel EXIREL op basis van de actieve stof *cyantraniliprole*, een reguliere etiketuitbreiding gekregen in onbedekte teelten van onder andere: bessen, bramen en frambozen (NL-KUG). In kersen is een verlaagde dosering, van maximaal 0,6 liter per hectare, nu één keer per twee jaar toegestaan (zoals ook in pitvruchten: appel & peer).

Naast Suzuki-fruitvlieg heeft EXIREL een werking op diverse rupsen (wintervlinders & bladrollers) en muggen. Afhankelijk van dosering en inzetmoment, is er een neveneffect op o.a. bladluizen en jonge wantsen of kevers (opname van de actieve stof is nodig). EXIREL is veilig voor veel natuurlijke vijanden. Het product is geformuleerd als een op *olie* gebaseerde SE-formulering.



In de teelt van braam, framboos, aalbes (incl. rode bes), kruisbes en blauwe bes, mag EXIREL toegepast worden vanaf einde bloei (BBCH 71) tot en met de vruchten oogstrijp zijn (BBCH 85). Het middel in houtig kleinfruit is toepasbaar vanaf juni tot en met eind september. Bij de teelt van kersen in een dosering per hectare van meer dan 0,6 liter (tot 0,75 liter), het middel toepassen ná de bloei (BBCH 71) vanaf juli tot en met augustus. In pruimen ná de bloei (BBCH 71) t/m de vruchten “plukrijp” zijn (BBCH 87).

Tabel. Etikettekst EXIREL, toelatingsnummer: 16748 N (W1).

Gewassen (OT = Onbedekte Teelten)	Maximale dosering	Maximaal aantal toepassingen	Veiligheidstermijn tot de oogst (VT)
Aalbes, kruisbes en blauwe bes (OT)	0,72 liter per ha	1x per 2 jaar	3 dagen
Braam- en framboosachtige (OT)	0,72 liter per ha	1x per 2 jaar	3 dagen
Kers (OT)	0,75 liter per ha	1x per 3 jaar óf	7 dagen
	0,60 liter per ha	1x per 2 jaar	7 dagen
Pruim (OT)	0,60 liter per ha	1x per 2 jaar	7 dagen

- Let op: product mag op zijn vroegst in het 2e kalenderjaar ná de laatste toepassing op hetzelfde perceel worden toegepast, waarbij in de tussenliggende periode ook géén andere middelen op basis van *cyantraniliprole* mogen worden toegepast (zoals het product MINECTO ONE). Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden (GWB).
- DRT: om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen of insecten te beschermen is toepassing van EXIREL uitsluitend toegestaan als op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een driftreductie-techniek uit tenminste de klasse DRT 95%, in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 450 cm óf een techniek uit de klasse DRT 97,5% in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 300 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste bomenrij of de laatste boom in de rij tot aan de perceelgrens).
- Bloei: om bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag dit product *niet* gebruikt worden op in bloei staande gewassen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruiden vóórdat het bloeit. Check de actuele etikettekst op: www.ctgb.nl (“toelatingendatabank”).

Raadpleeg voor gerichte adviezen in uw gewassen één van onze teeltadviseurs!